

**MAVRIK 2F**  
Taimekaitsevahend  
Insektitsiid

Toodet Mavrik 2F väikepakendis kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokolil, peakapsal, rooskapsal ja dekoratiivtaimedel. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud, kaalikas, suhkru-, sööda- ja söögipeet ja dekoratiivtaimed kasvuhoones.

<b>Toimeaine:</b>	tau-fluvalinaat 240 g/l
<b>Preparaadi vorm:</b>	emulsioon, õli vees (EW)
<b>Pakend:</b>	5 ml, 10 ml, 30 ml
<b>Eesti reg-nr:</b>	0065/22.12.04
<b>Partii nr ja valmistamise kuupäev:</b>	vaata pakendilt

**Taimekaitsevahendit Mavrik 2F 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.**

**Kasutuspiirang:** Toodet Mavrik 2F ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil; lähemal kui 20 m pinnaveekogudest porgandil, kapsastel, kaalikal, suhkru-, sööda- ja söögipeedil; lähemal kui 30 m pinnaveekogudest dekoratiivtaimedel ning õuna- ja pirnipuudel.

**NB! Kuna Mavrik 2F on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.**



### Hoiatus

**Sisaldab ohtlikke aineid tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool.**

- H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
- P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P391** Mahavoolanud toode kokku koguda.
- P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
- SPe3** Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil, 20 m porgandil, kapsastel, kaalikal, suhkru-, sööda- ja söögipeedil, 30 m dekoratiivtaimedel, õuna- ja pirnipuudel.

**Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

**Loa valdaja:**

ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
P.O. Box 355,  
3830 AK Leusden  
Madalmaad

**Tootja:**

ADAMA Makhteshim Ltd.  
P.O.B. 60  
Industrial Zone  
84100 Beer-Sheva  
Iisrael

**Pakendaja:**

UAB Baltic Agro  
Perkūnkiemio g. 2, Vilnius  
Leedu  
UAB "Litagros prekyba", Savanoriu pr 173,  
LT-03150, Vilnius, Leedu  
UAB "Innovative company MKDS",  
Piliakalnio st.68 LT-15175 Nemenčine,  
Leedu

**ESMAABI**

Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.

**Preparaadi nahale sattudes** võtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.

**Silma sattumisel** pesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.

**Sissehingamisel** väljuda ohtlikust tsoonist.

**Allaneelamisel** mitte esile kutsuda oksendamist, loputada suud põhjalikult veega ning juua palju vett. Vajadusel pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.

**KESKKONNAOHTLIKKUS**

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni!

**HOIUSTAMINE**

Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +30°C. Avamata originaalpakendis säilitusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

**TAARA PURUNEMISEL**

Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

**TAARA KAHJUTUSTAMINE**

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

## ETTEVAATUSABINÕUD

Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit.

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist.

## ÜLDINE TEAVE

Mavrik 2F hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktisel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. **Mavrik 2F on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).**

## KASUTAMINE

Pritsida kahjurite ilmumisel

Kultuur	Töölahus: Mavrik 2F ml/10 l vee kohta	Kahjurid	Ooteaeg (päevi)	Pritsimis- kordade arv	Pritsimisfaas
Roheline hernes kaunaga ja kaunata	6	Hernekärsakad ( <i>Sitona sp.</i> ), herneriplane ( <i>Kakothrips pisivorus</i> ), herne-lehetäi ( <i>Acyrtosiphon pisum</i> ), hernemähkur ( <i>Cydia nigricana</i> )	7	1-2	Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub üles, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks.
Hernes (täisküpsuses koristatav)	6	Hernekärsakad ( <i>Sitona sp.</i> ), herneriplane ( <i>Kakothrips pisivorus</i> ), herne- lehetäi ( <i>Acyrtosiphon pisum</i> ), hernemähkur ( <i>Cydia nigricana</i> )	14	1-2	Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub ülesse, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks.
Oad (täisküpsuses koristatavad)	6	Oa-lehetäi ( <i>Aphis fabae</i> )	14	1-2	Õiepungad on nähtaval, kuid kaetud veel lehtedega kuni peaaegu kõik kaunad on saavutanud oma

					lõpliku pikkuse
Kartul	6	Kartulimardikas ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), lehetäid ( <i>Aphids</i> ), lehetirtlased ( <i>Empoasca vitis</i> , <i>Empoasca solani</i> , <i>Euptetyx atropunctata</i> )	7	1-2	Peavarre 2. leht on lahti keerdunud (> 4 cm) kuni 95% mugulatest on koore moodustumine lõppenud ja apikaalses otsas ka kinnistunud.
Porgand	8	Porgandi-lehekirp ( <i>Trioza apicalis</i> ), porgandikärbes ( <i>Psila rosae</i> )	14	1-2	Kolmas pärisleht on lahti voltinud kuni 10 või enam pärislehte on lahti voltinud.
Lillkapsas, brokoli, peakapsas ja rooskapsas	8	Suur kapsaliblikas ( <i>Pieris brassicae</i> ), väike kapsaliblikas ( <i>P. napi</i> ), kapsakoi ( <i>Plutella xylostella</i> ), kapsakärbes ( <i>Delia</i> sp.), maakirbud ( <i>Phyllotreta</i> sp.), naerihiiilamardikas ( <i>Meligethes aeneus</i> ), kapsa tuhktäi ( <i>Brevicoryne brassica</i> )	7	1	Idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või esimene leht on nähtav kuni pea on omandanud tüüpilise suuruse ja kuju, pea on tihedalt koos.
Dekoratiivtaimed (avamaal ja kasvuhoones)	6	Lehetäid, lestad, lehekirbud ( <i>Psyllidae</i> ), mardikalised ( <i>Coleoptera</i> )	-	1-2	

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele:

Kultuur	Töölahus: Mavrik 2F ml/10 l vee kohta	Kahjurid	Pritsi- mis- kordi	Oote-aeg (päevi)	Märkused/ kasvufaas
Õuna- ja pirnipuud	8	Lehetäilased ( <i>Aphididae</i> ), Õuna-(pihlaka-) koi ( <i>Argyresthia conjugella</i> ), Õunapuu-õielõikaja ( <i>Anthonomus pomorum</i> )	1	30	Õiepungade paisumisest kuni viljad arenenud 90% sordiomasest suuruselt (BBCH 51-79).
Kaalikas, suhkru-, sööda- ja söögipeet	6	Lehetäilased ( <i>Aphididae</i> ), peedi-rohuhüpik ( <i>Chaetocnema concinna</i> ), peedikärbes ( <i>Pegomya hyoscyami</i> )	1-2	14	Idanemise lõpust, kui iduarre pikkus on 2 korda suurem seemne diameetrist kuni lehestik ja juurikas on saavutanud lõpliku suuruse BBCH 09-39. Lehti toiduks mitte kasutada.

**Õuna- ja pirnipuude pritsimisel tuleb veorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 30 m pinnaveekogudest ning kasutada triivi vähendavaid otsikuid. Kaalikal, suhkru-, sööda- ja söögipeedil pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 20 m pinnaveekogudest.**

10 l töölahusega saab pritsida 330 m<sup>2</sup> (300 l töölahust/ha).

Pritsimiste vaheline intervall kaalikal, suhkru-, sööda- ja söögipeedil 10-14 päeva, teistel kultuuridel 14 päeva.

## KASUTUSVIIS

Pritsimiseks võib kasutada erinevat pritsimisvarustust.

10 l töölahusega saab pritsida 330 m<sup>2</sup> (300 l/ha).

Vajaliku koguse töölahusega peab töödeldava pinna katma võimalikult ühtlaselt.

## TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Enne pritsipaagis töölahuse valmistamist testida pritsimisseadet veega, et mõõta töölahuse kasutust 100 m<sup>2</sup> kohta. Vastavalt sellele on võimalik teha parandusi liikumise kiiruse kohta pritsimise ajal.

10 l töölahust on piisav 330 m<sup>2</sup> töötlemiseks (300 l/ha). Kui pritsitav ala on väiksem kui 330 m<sup>2</sup>, on vaja teha ümberarvestus.

Näiteks, kui pritsitav ala on 100 m<sup>2</sup>, siis võta 3 l vett ja lisa:

- 1,8 ml Mavrik 2F'i, kui doos on 6 ml / 10 l vee kohta;

- 2,4 ml Mavrik 2F'i, kui doos on 8 ml / 10 l vee kohta.

Täitke paak 2/3 ulatuses puhta veega. Lisage alati Mavrik 2F pritsipaaki esimesena.

ADAMA ei soovita segu boorväetisega. Kui soovite segada boori või muid väetiseid, võtke lisateabe saamiseks ühendust ADAMA esindajaga. Iga kord pärast pritsimist tuleb prits puhastada hoolikalt veega ning loputusvesi pritsida eelnevalt pritsitud alale.

## Märge!

Maksimaalne pritsimiseks lubatud piirkond päevas on 1000 m<sup>2</sup>. Pritsida tuule kiirusega kuni 3 m/s.

Selleks, et vältida pritsimise negatiivset mõju koduloomade ja inimeste tervisele, ei ole lubatud pritsimisega mitteseotud isikutel ning koduloomadel olla alal, kus pritsimine toimub.

Kultuuride kahjustuste ärahoidmiseks pritsida võimalikult vara, hiljemalt esimeste kahjustuste ilmumisel. Pritsimistulemus on nähtav 4 päeva pärast töötlemist. Vajaduse korral pritsimist korrata 2-3 nädalase intervalliga.

Lillkapsa, brokoli, peakapsa ja rooskapsa puhul pole teist korda pritsida lubatud.

### **Kahjuritõrje optimaalsed tingimused**

Optimaalsed tulemused saadakse siis, kui:

- kahjurputukad on aktiivsed ja puutuvad kokku pritsitava vedelikuga;
- kahjurputukad on tundlikus kasvustaadiumis.

Toode on vihmakindel 2 tundi peale pritsimist.

Kui optimaalsed tingimused ei ole täidetud, võib mõju halveneda. Sellistes tingimustes ei tohi doosi vähendada.

### **PAAGISEGUD**

Mavrik 2F'i võib segada paljude agrokeemiliste toodetega, v.a. leeliselised pritsimisvedelikud. Kuna on võimatu teada kõiki müügil olevaid preparaate, siis tootja ei saa vastutada segatud pritsimisvedelike eest, mis ei ole soovitatud nende spetsialistide poolt.

**Mitte segada kokku Mavrik 2F'i rohkem kui ühe muu tootega. Mavrik 2F'i lisada paagisegusse esimese komponendina.**

### **Märkus**

Tootja vastutab pestitsiidi kvaliteedi eest juhul, kui see on pakitud firma poolt. Tootja firma ei saa vastutada kahjustuste eest, mis on põhjustatud preparaadi säilitamise ja kasutamise instruksioonide mittejärgimisest.